

CORONAVÍRUS (COVID-19)

FAST-TRACK PARA OS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais - Coordenação Estadual de Atenção às Urgências e Emergências

OBJETIVOS: Agilizar o atendimento dos casos de Síndrome Gripal nos serviços da Urgência e Emergência, incluindo os casos de COVID-19, priorizando idosos e o grupo de risco, e evitar o contágio local entre os demais pacientes.

ALVO: Serviços de Urgência e Emergência

COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA EQUIPE: Auxiliar/técnico (a) de enfermagem; Enfermeiro (a); e Médico (a).

PACIENTE PROCURA O SERVIÇO DE URGÊNCIA

PRIMEIRO CONTATO

Se o primeiro contato ocorrer no serviço de admissão e o profissional atendente não for profissional de saúde as perguntas serão limitadas à identificação do paciente com sintomas respiratórios.

Critério Positivo

Garantir o uso da máscara cirúrgica e direcionar o paciente para o circuito de isolamento respiratório para evitar contato e contágio das pessoas do circuito convencional.

Sala de isolamento respiratório

O Enfermeiro deverá concluir o processo de classificação do paciente para verificar se atende aos critérios de caso suspeito de COVID-19.

Critério Negativo

Direcionamento do paciente pelo circuito convencional.

- 1) Técnico de Enfermagem: realizar o check list e atentar para os sintomas respiratórios graves. Caso haja, acionar o enfermeiro.
- 2) Enfermeiro: check list e atentar para os sintomas respiratórios; Notificação compulsória de acordo com as orientações do MS e CIEVS MG; encaminhar paciente para observação exclusiva.
- 3) Médico: check list e classificação de gravidade.

NA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO ELO PROTOCOLO DE MANCHESTER

Caso Grave

• **Adultos e Gestantes:**
Síndrome respiratória aguda grave: síndrome gripal que apresente: Dispneia/desconforto respiratório OU Pressão persistente no tórax OU Saturação de O₂ menor que 95% em ar ambiente OU Coloração azulada de lábios ou rosto.
*Importante: em gestantes, observar hipotensão.
• **Crianças:**
Taquipneia: ≥ 70 rpm para menores do que 1 ano; ≥ 50 rpm para crianças maiores do que 1 ano; Hipoxemia; Desconforto respiratório; Alteração da consciência; Desidratação; Dificuldade para se alimentar; Lesão miocárdica; Elevação de enzimas hepáticas; Disfunção da coagulação; rabdomiólise; Qualquer outra manifestação de lesão em órgãos vitais.

Caso Moderado

Tosse persistente + febre persistente diária
OU Tosse persistente + piora progressiva de outro sintoma relacionado à COVID-19 (adinamia, prostração, hiporexia, diarreia) OU Pelo menos um dos sintomas acima + presença de fator de risco.

Caso Leve

Síndrome gripal: tosse, dor de garganta ou coriza seguido ou não de: Anosmia (disfunção olfativa), Ageusia (disfunção gustatória), Coriza, Diarreia, Dor abdominal, Febre, Calafrios, Mialgia - Fadiga - Cefaleia

Deve-se haver a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para precaução padrão e por aerossóis; Os procedimentos que geram aerossóis só deverão ser considerados caso sejam estritamente necessários para o manejo clínico do caso.

Sinais de gravidade Adulto:** Dispneia/desconforto respiratório OU Pressão persistente no tórax OU Saturação de O₂ menor que 95% em ar ambiente OU Coloração azulada de lábios ou rosto - **consultar protocolo clínico.** ***Sinais de gravidade Criança:** Taquipneia: ≥ 70 rpm para menores do que 1 ano; ≥ 50 rpm para crianças maiores do que 1 ano; Hipoxemia; Desconforto respiratório; Alteração da consciência; Desidratação; Dificuldade para se alimentar; Lesão miocárdica; Elevação de enzimas hepáticas; Disfunção da coagulação; rabdomiólise; Qualquer outra manifestação de lesão em órgãos vitais - **consultar protocolo clínico.** *Comorbidades:** Idade igual ou superior a 60 anos; Miocardiopatias de diferentes etiologias (insuficiência cardíaca, miocardiopatia isquêmica etc.); Hipertensão; Pneumopatias graves ou descompensadas (asma moderada/grave, DPOC); Tabagismo; Obesidade; Imunodepressão; Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); Diabetes mellitus, conforme juízo clínico; Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; Neoplasia maligna; Gestação de alto risco. - **consultar protocolo**

(Adaptado de Fast-Track para Atenção Primária em locais com transmissão comunitária. Ministério da Saúde, 2020)